

**Leki do zwalczania Varroa destructor zarejestrowane w Polsce, podlegające refundacji  
Oferta 2024**

Produkt	opakowanie	Substancja czynna	Stosowanie	ilość na 1 rodzinę	Ilość leczonych rodzin z 1 opakowania
Apiwarol	25 tabletek	amitraz 12,5 mg/tab.	tabletki do odymiania	3 x 1 tab. co 6 dni jesienią 2 x 1 tab. co 6 dni wiosną	5
Biowar Biowet Puławy	10 pasków	amitraz 500 mg/pasek	paski do zawieszania w ulu	2 paski przez 8 tyg.	5
Apivar Veto Pharma Francja	10 pasków	amitraz 500 mg/pasek	paski do zawieszania w ulu	2 paski przez 8 tyg.	5
Apistrip Biowet Puławy	10 pasków	amitraz 500 mg/pasek	paski do zawieszania w ulu	2 paski przez 8 tyg.	5
Bayvarol	5 x 4 paski	flumetryna 3,6 mg/pasek	paski do zawieszania w ulu	4 paski przez 42 dni	5
Polyvar yellow	10 pasków	flumetryna 275 mg/pasek	paski do umieszczania w ulu	2 paski przez 2-3 m-ce	5
ApiLifeVar	2 płytki	zawartość 1 płytki: tymol 8,00 g olejek eukalipt. 1,72 g kamfora racemiczna 0,39 g lewomentol 0,39 g	płytki do umieszczania w ulu	1 płytka 4 x co 7 dni	0,5
Apiguard	1 tacka	tymol 12,5 g/tacka	tacki do umieszczania w ulu	1 tacka 2 x co 14 dni	1
Thymovar	10 pasków	tymol 15 g/pasek	paski do umieszczania w ulu	1 pasek 2 x co 21 dni	5
Api-Bioxal	500 ml	kwas szczawiowy 44,2g/ml	roztwór do polewania	1x 50 ml	10
Varromed	555 ml	kwas szczawiowy 31,42 mg/ml kwas mrówkowy 5mg/ml	zawiesina do polewania	1 do 3 x 45 ml co 6 dni	10
Oxybee	750g + 2x125g	kwas szczawiowy 28,1 mg/ml	proszek i roztwór do sporządzania zawiesiny	1 x 54 ml	16
Formicprotect	10 saszetek (20 pasków)	kwas mrówkowy 62,2 g /pasek	paski do umieszczania w ulu	2 paski na rodzinę przez 7 dni	10

W przypadku zastosowania pasków/płytek (**Biowar, Apistrip, Apivar, Bayvarol, ApiLifeVar, Apiguard, Thymovar**) zaleca się użycie ich po ostatnim miodobraniu. Po ich wyjęciu wskazane jest przeprowadzenie dodatkowych zabiegów zwalczających warrozę późną jesienią lub/i wiosną.

Dlatego w przypadku wybrania do leczenia warrozy preparatów **Biowar, Apistrip, Apivar, Bayvarol, ApiLifeVar, Apiguard, Thymovar**, istnieje możliwość dodatkowego zalecenia stosowania **Apiwarolu** (w przeliczeniu 2 tabletki na rodzinę) lub preparatów z kwasem szczawiowym (**ApiBioxal, Varromed** - w przeliczeniu 1 opakowanie na 10 rodzin)